

การแสดงผลของสัตว์ที่ติดเชื้อ พิษสุนัขบ้า 2 แบบ

1 แบบก้าวร้าว เป็นลักษณะอาการที่พบโดยส่วนใหญ่สัตว์จะมีอาการดุร้ายกระวนกระวายวิ่งไล่กัดคนหรือสัตว์ทุกชนิดที่ขวางหน้า นอกจากนี้ยังสังเกตได้ชัดจากน้ำลายที่ไหลย่อยเนื่องจากเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อขากรรไกร ตัวเกร็ง หางตก ต่อมาจะเกิดอาการอัมพาต ขาหมดแรง หมดสติ และตายภายในไม่กี่วันจนถึง 2 สัปดาห์

2 แบบเชื่องซึม ประเภทนี้จะสังเกตได้ยากกว่า สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายเป็นโรคอื่นๆ เก็บตัวอยู่เฉยๆ ดูไม่มีอันตราย อาจกัดคนหรือสัตว์อื่นเมื่อถูกรบกวน จากนั้นจะเกิดอัมพาต และตายในที่สุด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้กี่ปี?

ไม่มีระยะเวลาป้องกันของวัคซีนที่ชัดเจน ดังนั้นหากรับเชื้อหรือถูกกัดหลังจากฉีดเข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือนขึ้นไป ต้องกลับมารับวัคซีนกระตุ้นทันที แต่อาจฉีดเพียง 2 เข็ม หรือขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน

นอกจากนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงรับเชื้อพิษสุนัขบ้าในชีวิตประจำวัน เช่น เลี้ยงสุนัข ควรรับวัคซีนทุก 2 ปี และหากมีความเสี่ยงสูง เช่น ทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้า อาจต้องฉีดกระตุ้นทุก 6 เดือน ร่วมกับตรวจเลือดเพื่อกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนด้วย

ใครบ้างที่ควร ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า?

ผู้ที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อาจมีดังนี้

ผู้ที่เป็นสัตว์แพทย์

ผู้ที่ต้องดูแลสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์

ผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า

ผู้ที่สัมผัส หรือมีโอกาสสัมผัสสัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อ

ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ อาจมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับเชื้อ

ผู้ที่ถูกสัตว์พาหะกัด ข่วน หรือทำให้เป็นแผล

โดยปกติแล้วโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล หรือแม้แต่ในคลินิก ออานามัย หรือสถานพยาบาลเกือบทุกแห่งจะมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำรองไว้ เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคฉุกเฉินที่ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และเป็นโรคที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล หากถูกสุนัขกัดก็สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย



เทศบาลตำบลวังโพธิ์

เว็บไซต์ : <http://www.wangphoccity.com/>

โทร 034 591006



ร้อนนี้ระวัง !

ภัยใกล้ตัวที่อาจคาดไม่ถึง

โรคพิษสุนัขบ้า

" โรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาได้
แต่สามารถป้องกันได้ "

ผู้ที่เป็โรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา
แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน!

โรคพิษสุนัขบ้า

คือโรคอะไร ?

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน!



อาการโรคพิษสุนัขบ้า มีอะไรบ้าง ?

อาการเริ่มแรก : ไข้ต่ำ เจ็บคอ เมื่ออาหาร อ่อนเพลีย และต่อมามีอาการคันบริเวณแผลที่ถูกกัด มีอาการคลุ้มคลั่ง

อาการทางประสาท : กระสับกระส่าย กลัวแสง ไม่ชอบเสียงดัง กระวนกระวาย มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว อย่างเช่นน้ำ โดยจะมีอาการเกร็ง ทำให้ไม่ยอมดื่มน้ำ

อาการสุดท้าย : เกร็ง หายใจไม่ออก แขนหน้าอก กล้ามเนื้อกระตุก รวมถึงแขนขาอ่อนแรงลง หมด สติและเสียชีวิตในที่สุด

.....

ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงหลังได้รับเชื้อ ประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี

.....



พิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



หากถูกกัดแล้ว

ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร?

- ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงก้นแผล และล้างสบู่ออกให้หมด (ทำซ้ำเป็นเวลานาน 15 นาที)
- ทายาเบตาดีน การล้างแผลจะช่วยโอกาสการติดเชื้อได้ถึง 80%
- รีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ประเมินระดับของบาดแผล และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า